


IRIDOTOMIE
AU LASER



INSTITUT DE L'ŒIL
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous, veuillez nous appeler **au moins 24 heures à l'avance** au **450.419.6345**.

Si vous omettez de nous informer de votre absence, des frais de **50,00\$** vous seront facturés.



L'Institut de l'œil des Laurentides
4800, rue Ambroise-Lafortune
Boisbriand, Québec
J7H 1S6

Téléphone: **450.419.ŒIL (6345)** ou
1.888.419.ŒIL (6345)
Télécopieur: **450.434.YEUX (9389)**
institutdeloeil.com



IRIDOTOMIE AU LASER

DÉFINITION

L'iridotomie au laser est un traitement fréquemment pratiqué pour prévenir le glaucome par fermeture d'angle. Ce traitement est principalement préventif, mais il peut aussi être curatif.

L'angle irido-cornéen trop étroit décelé dans votre oeil par votre optométriste et/ou ophtalmologiste vous prédispose à faire une crise de glaucome.

Les symptômes d'une crise de glaucome peuvent se manifester par :

- Maux de tête sévères
- Douleur oculaire
- Embrouillement visuel
- Nausées
- Vomissements

La crise de glaucome peut entraîner une perte de vision irréversible.

L'iridotomie consiste à faire un trou microscopique à la périphérie de l'iris pour rééquilibrer la circulation de l'humeur aqueuse (liquide à l'intérieur de l'oeil).



L'Institut de l'œil des Laurentides est un Centre Médical Spécialisé agréé, pour une 2^e fois consécutive, avec la plus haute distinction par Agrément Canada « Agréé avec mention d'honneur ».

Le processus d'agrément sert à évaluer et à améliorer la qualité et la sécurité des interventions et à normaliser les politiques et procédures.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Un membre du personnel vous explique la procédure et vous fait signer un consentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
- Des gouttes de lopicine (0.5%) seront instillées dans votre oeil afin de prévenir une hausse de pression.
- Des gouttes de pilocarpine (1% ou 2%) sont instillées dans votre oeil à 1 ou 2 reprises. Ce médicament provoque une constriction de votre pupille. Certaines personnes peuvent ressentir un mal de tête passager.
- Vous êtes assis face au laser.
- Une goutte anesthésiante est instillée dans votre oeil et votre tête est positionnée.
- Un verre de contact spécial est placé sur votre oeil.
- Le traitement s'effectue habituellement en moins d'une minute.
- Lors du traitement, vous pouvez ressentir de petits picotements et/ou pincements.
- Prévoyez un accompagnateur.

APRÈS LE TRAITEMENT :

- Si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol). Ces maux de tête peuvent durer quelques heures.
- Vous devez mettre les gouttes prescrites pour 5 jours.
- Vous pouvez reprendre vos activités le lendemain du traitement.
- Un prochain rendez-vous sera organisé.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

- Votre vision est embrouillée temporairement.

URGENCE

450.419.6345

1.888.419.6345

Consultez-nous RAPIDEMENT si :

- Vous constatez l'apparition soudaine de points noirs flottants ou d'étincelles dans les jours qui suivent le traitement.
- Vous avez ou développez de la douleur qui persiste plus de 24 heures après le traitement.

POUR NOUS REJOINDRE



L'INSTITUT DE L'ŒIL
DES LAURENTIDES

Semaine (du lundi au vendredi)

À l'Institut de l'œil des Laurentides au
450.419.6345 ou 1.888.419.6345

Soirs / fins de semaine / jours fériés

À l'urgence de votre hôpital.

Avisez l'urgentologue que vous
avez récemment eu un traitement
ou une chirurgie. Ce dernier com-
muniquera avec l'ophtalmologiste
de garde, au besoin.

L'Institut de l'œil des Laurentides

4800, rue Ambroise-Lafortune
Boisbriand, QC, J7H 1S6

L'INSTITUT DE L'ŒIL DES LAURENTIDES vous offre le plan de financement
Accord D (12 versements égaux, sans frais et sans intérêt).

* Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.

